

DE

Wirkung von Gynofit Milchsäure-Gel


Gynofit Milchsäure-Gel dient dazu, den physiologischen pH-Wert des Vaginalmilieus zu stabilisieren und dadurch die Vaginalflora zu normalisieren.

Vorgesehene Anwendung

- Gynofit wurde in Zusammenarbeit mit Gynäkologen für eine schnelle und sanfte Linderung von Vaginalproblemen entwickelt.
- Zur Vorbeugung und kurzzeitigen Behandlung (in der Regel 6-12 Tage) von bakterieller Vaginose und Scheidenpilzinfektionen.
- Zur Anwendung bei bakterieller Vaginose in Kombination mit Antibiotika.
- Normalisiert die Vaginalflora und reguliert den pH-Wert.
- Vermindert unangenehmen Geruch und Ausfluss.
- Lindert unmittelbare Reizungen, Rötungen, Brennen und Juckreiz.

Art der Anwendung und Dosierung

Gynofit ist ein Gel, welches man am Abend in liegender Stellung in die Scheide einführt. Jede Tube entspricht einer Anwendungsmenge. Das Gel wird direkt aus dem speziell geformten, versiegelten Applikator in die Vagina eingebracht.



Nebenwirkungen
Die Zusammensetzung von Gynofit Milchsäure-Gel lässt bei sachgemässer Anwendung gemäss Herstellerempfehlung das Auftreten von Nebenwirkungen über ein anfängliches, aber reversibles Brennen und/oder Jucken hinaus nicht erwarten. Bei hierfür prädisponierten Menschen, insbesondere auch bei vorgeschädigter Vaginalschleimhaut etwa durch ungünstige Pflege-, Hygiene- oder lokalkontrazeptive Massnahmen, können im Einzelfall auch Schleimhautreizungen durch das Gel auftreten. In diesem Falle ist die Anwendung von Gynofit Milchsäure-Gel abzubrechen; auch auf spätere erneute Anwendung sollte verzichtet werden.

Gegenanzeigen

Bei bekannter Allergie gegen die unten genannten Inhaltsstoffe ist von der Anwendung von Gynofit Milchsäure-Gel abzusehen. Bei Auslösung entsprechender Reaktionen ist die Anwendung des Gels unverzüglich abzubrechen. Gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung

Kurzzeitige Anwendung bei bakterieller Vaginose und Scheidenpilzinfektionen. Bei schlecht riechendem Ausfluss, Reizungen, Rötungen, Brennen und Juckreiz im Vaginalbereich. Behandlung: 6-12 Tage lang jeweils 1 Applikator idealerweise abends anwenden, bis die Beschwerden nicht mehr vorhanden sind. Vorbeugen: Nach der Menstruation, Geschlechtsverkehr und Schwimmbadbesuch 1-2 Tage lang jeweils 1 Applikator anwenden. Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel bevorzugt vor dem Schlafengehen anwenden.

Hinweise

Wenn die Beschwerden auch bei vorschriftsmässiger Anwendung nicht gelindert werden, so setzen Sie sich bitte spätestens nach 12 Tagen ununterbrochener Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung. Gynofit kann nicht zur Empfängnisverhütung verwendet werden und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe.

Bezüglich der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden liegen keine Informationen vor. Gynofit Milchsäure-Gel kann zusammen mit Kondomen angewendet werden.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Tuben vollständig entleeren, geöffnete Tuben kein weiteres Mal verwenden. Beschädigte Applikatoren dürfen nicht verwendet werden. Bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufbewahren. Verfalldatum siehe Packungsaufdruck.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid



Vertrieb CH: Tentan AG, 4452 Itingen

Vertrieb DE & AT: H&M Holzinger Cosmetic Vertriebs-Gesellschaft m.b.H, 5017 Salzburg-AT

www.gynofit.com
04.2026

☎ € 0483 MD

GR

Τρόπος δράσης της γέλης Gynofit με γαλακτικό οξύ

Η γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση του φυσιολογικού pH του κόλπου, αποκαθιστώντας έτσι την κολληκή χλωρίδα.


Προβλεπόμενη χρήση

Το Gynofit αναπτύχθηκε σε συνεργασία με γυναικολόγους για την ταχεία και ήπια ανακούφιση των προβλημάτων στην κολληκή περιοχή.

- Για την πρόληψη και τη βραχυχρόνια θεραπεία (συνήθως 6-12 ημέρες) της βακτηριακής κολλίτιδας και των κολληκών μυκητιάσεων.
- Για τη θεραπεία της βακτηριακής κολλίτιδας σε συνδυασμό με αντιβιοτικά.
- Αποκαθιστά την κολληκή χλωρίδα και ρυθμίζει το pH του κόλπου.
- Μειώνει τις δυσάρεστες οσμές και εκκρίσεις.
- Ανακουφίζει αμέσως από ερεθισμό, ερυθρότητα, αίσθημα καύσου και κνησμό.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

Το Gynofit συνιστάται σε γέλη η οποία εφαρμόζεται στον κόλπο σε ύπτια θέση το βράδυ. Κάθε σωληνάριο περιέχει μία δόση. Η γέλη εφαρμόζεται απευθείας στο εσωτερικό του κόλπου πιέζοντας το ειδικά διαμορφωμένο κα σφραγισμένο σωληνάριο εφαρμογής.



Αντιεπιθύμητες ενέργειες
Βάσει της σύνηθες χρήσης, και υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ουσιά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η γέλη Gynofit με γαλακτικό γξύ δεν αναμένεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, πέραν ενός αρχικού, αλλά παροδικού αισθήματος καύσου ή/και κνησμού. Σε άτομα με προεξισμένη εμφάνιση εξηρότητας, ιδίως εάν ο κολλητικός βλεννογόνος έχει ήδη υποστεί βλάβη, για παράδειγμα λόγω ανεπαρκούς φροντίδας/υγιεινής ή από τη χρήση τοπικών αντισυλληπτικών, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις η γέλη να προκαλέσει ερεθισμό τού. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση της γέλης. Συζητήστε με γυναικολόγο ή και μη συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε στο μέλλον.

Αντενδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε τη γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργική σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που παρατίθενται παρακάτω. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων αντιδράσεων, διακομίστε αμέσως τη χρήση της γέλης και, αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό.

FR

Mode de fonctionnement du gel à l'acide lactique Gynofit


Le gel à l'acide lactique Gynofit est utilisé pour stabiliser le pH physiologique du vagin et rétablir ainsi l'équilibre naturel de la flore vaginale.

Indication

- Gynofit a été élaboré en collaboration avec des gynécologues dans le but de soulager les désagréments vaginaux rapidement et tout en douceur.
- En prévention et dans le traitement de courte durée (généralement de 6 à 12 jours) de la vaginose bactérienne et de la mycose vaginale.
- Utiliser en association avec des antibiotiques en cas de vaginose bactérienne.
- Rééquilibrer la flore vaginale et régule le pH.
- Réduit les odeurs désagréables et les pertes vaginales.
- Apaise instantanément les imitations, rougeurs, sensations de brûlure et démangeaisons.

Mode d'emploi et posologie

Gynofit est un gel qui doit être introduit dans le vagin en position couchée, dans la soirée. Chaque tube contient la dose nécessaire pour une application. Le gel est déposé directement dans le vagin au moyen de l'applicateur ergonomique scellé.



Effets indésirables

Étant donné la composition du gel à l'acide lactique Gynofit, si le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant, la survenue d'effets indésirables est improbable, hormis les brûlures et/ou démangeaisons initiales réversibles. Chez les personnes prédisposées, en particulier si la muqueuse vaginale est déjà endommagée en raison de mesures de soin, d'hygiène ou de contraception locale inadaptées, par exemple, le gel peut également provoquer une irritation de la muqueuse dans des cas isolés. Le cas échéant, il conviendra d'arrêter l'utilisation du gel à l'acide lactique Gynofit et de ne plus le réutiliser par la suite.

Contre-indications

N'utilisez pas le gel à l'acide lactique Gynofit si vous êtes allergique à l'un des composants mentionnés ci-dessous. En cas de réaction allergique, arrêtez immédiatement d'utiliser le gel. Consultez un médecin, si nécessaire.

Utilisation

Utilisation de courte durée en cas de vaginose bactérienne et de mycose vaginale. En cas de pertes malodorantes, irritations, rougeurs, sensations de brûlure et démangeaisons de la zone vaginale. Traitement: utiliser un applicateur à chaque fois pendant 6 à 12 jours idéalement le soir, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. En prévention: utiliser 1 applicateur après les menstruations, les rapports sexuels et la piscine pendant 1 ou 2 jour(s). Appliquer le gel vaginal à l'acide lactique Gynofit de préférence au coucher.

Remarques

Si les symptômes persistent malgré une utilisation correcte du gel, consultez votre médecin ou pharmacien après 12 jours d'utilisation continue au maximum. Gynofit ne contient pas de spermicide et ne peut donc pas être utilisé comme contraceptif. Aucune information n'est disponible concernant l'utilisation du gel pendant la grossesse et l'allaitement. Le gel à l'acide lactique Gynofit est compatible avec les préservatifs. Tenir hors de la portée des enfants. Les tubes doivent être entièrement vidés et ne peuvent pas être réutilisés, une fois entamés. Ne pas utiliser les applicateurs endommagés. À conserver à température ambiante (entre 15–25 °C). Pour la date de péremption, voir l'emballage.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid



Distributeur Suisse : Tentan AG, 4452 Itingen

Distributeur France : Almafai, 68100 Mulhouse

www.gynofit.com
04.2026

☎ € 0483 MD

LT

Kaip veikia „Gynofit“ pieno rūgšties gelis

„Gynofit“ pieno rūgšties gelis vartojamas makšties terpės fiziologiniam pH stabilizuoti ir taip makšties mikroflorai normalizuoti.

Numatytasis vartojimas

- „Gynofit“ gelis sukurtas bendradarbiaujant su ginekologais, siekiant spartaus ir švelnaus makšties problemų sprendimo.
- Bakterinės vaginozės ir makšties kandidamikozės prevencijai ir trumpalaikiam gydymui (paprastai trunkančiam 6-12 dienų).
- Bakterinei vaginozei gydyti, vartojant kartu su antibiotikais.
- Atkuria makšties mikroflorą ir reguliuoja pH vertę.
- Sumažina nemalonus kvapus ir išskyras.
- Nedelsiant pašalina sudirgimą, paraudimą, deginimą ir niežėjimą.

Vartojimo metodas ir dozė

„Gynofit“ yra gelis, išspaudžiamas į makštį gulimoje padėtyje vakare. Kiekvienoje tubelėje yra viena dozė. Gelis išspaudžiamas tiesiai į makštį iš specialios formos, sandariai uždenyto aplikatoriaus.



Šalutinis poveikis

„Gynofit“ pieno rūgšties gelis dėl savo sudėties, jei vartojamas tinkamai pagal gamintojo rekomendacijas, neturėtų sukelti šalutinio poveikio, išskyrus iš pradžių pasireiškiantį, bet praeinantį deginimą ir (arba) niežėjimą. Pavieniais atvejais gelis taip pat gali sukelti pavienius dirginimus linkusius į tokias reakcijas asmenims, ypač jei makšties gleivinė jau yra pažeista, pvz., dėl netinkamos priežiūros, higienos ar vietinio poveikio kontraceptikų vartojimo. Tokiu atveju nutraukite „Gynofit“ pieno rūgšties gelio vartojimą; taip pat nepradėkite jo vartoti vėliau.

Kontraindikacijos

Nevertinkite „Gynofit“ pieno rūgšties gelio, jeigu Jums nustatyta alergija bet kuriai iš toliau išvardytų pagalbinių medžiagų. Jei atsirado tokių reakcijų, nedelsdami nutraukite gelio vartojimą. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

IT

Meccanismo d'azione del gel all'acido lattico Gynofit

Il gel vaginale all'acido lattico Gynofit si usa per stabilizzare il pH fisiologico dell'ambiente vaginale e normalizzare così la flora vaginale.

Uso previsto

- Gynofit è stato sviluppato in collaborazione con esperti ginecologi per alleviare i problemi vaginali in modo rapido e delicato.
- Per la prevenzione e il trattamento di breve durata (di norma 6-12 giorni) di vaginosi batteriche e micosi vaginali.
- Da utilizzare in caso di vaginosi batterica in combinazione con antibiotici.
- Normalizza la flora vaginale e regola il valore di pH.
- Riduce gli odori sgradevoli e le secrezioni.
- Offre immediato sollievo in caso di irritazioni, arrossamenti, bruciore e prurito.

Modo di somministrazione e posologia

Gynofit è un gel da applicare all'interno della vagina, la sera, stando in posizione sdraiata. Ogni tubetto monodose contiene la quantità di gel necessaria per un'applicazione. Il gel viene introdotto direttamente nella vagina utilizzando l'apposito applicatore anatomico sigillato.



Effetti collaterali

La composizione del gel vaginale all'acido lattico Gynofit, se il prodotto viene utilizzato correttamente seguendo le istruzioni del produttore, non causa altri effetti collaterali se non una iniziale e transitoria sensazione di bruciore e/o prurito. Tuttavia, in casi isolati, in soggetti predisposti e in particolare in presenza di preesistenti lesioni della mucosa vaginale dovute a trattamenti inadeguati, igiene inappropriata o a misure contraccettive locali, il gel può anche causare irritazione alla mucosa vaginale. In questo caso sospendere immediatamente l'uso del gel vaginale all'acido lattico Gynofit ed evitare di impiegarlo nuovamente in futuro.

Controindicazioni

Non usare il gel vaginale all'acido lattico Gynofit in caso di allergia nota nei confronti di uno o più componenti tra quelli di seguito elencati. Se si verificano reazioni allergiche, sospendere immediatamente l'uso del gel. Se necessario consultare un medico.

Applicazione

Impiego di breve durata nella cura di vaginosi batterica e micosi vaginali. In caso di secrezioni maleodoranti, irritazioni, arrossamenti, bruciore e prurito nella zona vaginale. Trattamento: utilizzare 1 applicatore, per una durata da 6 a 12 giorni, preferibilmente la sera, fino alla scomparsa dei sintomi. Prevenzione: utilizzare 1 applicatore per 1-2 giorni dopo le mestruazioni, i rapporti sessuali e dopo essere state in piscina. Usare Gynofit gel all'acido lattico preferibilmente prima di andare a letto.

Avvertenze

Se i sintomi persistono nonostante l'uso corretto, rivolgersi al proprio medico o al farmacista dopo 12 giorni di uso continuato al massimo. Gynofit non contiene sostanze spermicide e quindi non può essere usato per la contraccezione. Non ci sono informazioni sull'uso del gel vaginale all'acido lattico Gynofit in gravidanza e durante l'allattamento. Il gel vaginale all'acido lattico Gynofit può essere usato assieme ai preservativi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Svuotare completamente i tubetti, non riutilizzare i tubetti aperti. Gli applicatori danneggiati non vanno utilizzati. Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C). Per la data di scadenza del prodotto, vedere la confezione.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid



Distribuzione CH: Tentan AG, 4452 Itingen

www.gynofit.com
04.2026

☎ € 0483 MD

TR

Gynofit Laktik Asit Jel Etkisini Nasıl Gösterir


Gynofit Laktik Asit Jel, vajinal ortamın fizyolojik pH değerini stabilize etmek ve böylelikle vajinal florayı normalleştirmek amacıyla kullanılır.

Kullanım amacı

- Gynofit, vajinal bölgede gözlemlenen sorunları hızlı ve etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olmak üzere jinekologlar ile işbirliği içinde geliştirilmiştir.
- Bakteriyel vajinozis ve vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemek ve kısa süreli tedavi etmeye (genellikle 6-12 gün) yardımcı olmak için kullanılır.
- Antibiyotikler ile birlikte bakteriyel vajinozisi tedaviye yardımcı olmak için kullanılır.
- Vajinal florayı normalleştirmeye ve pH değerini düzenlemeye yardımcı olur.
- İstenmeyen kokuları ve akıntıyı azaltır.
- Tahriş, kızamıklik, yanma ve kaşıntı gibi etkilri kısa sürede gidermeye yardımcı olur.

Kullanım yöntemi ve dozu

Gynofit, akşamları uzanır pozisyonda yatarken vajina içine yerleştirilen bir jeldir. Her tüp, bir uygulama dozu içermektedir. Jel, özel olarak şekillendirilmiş ve mühürlenmiş olan aplikatörden doğrudan vajina içine sıkılır.



Yan etkiler

İçeriğine bakılacak olursa ve üreticinin tavsiyesine göre doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde, Gynofit Laktik Asit Jel'in ilk başta hissedilen ancak daha sonra geçen yanma ve/veya kaşıntı hissinin dışında başka herhangi bir yan etkisinin olması muhtemel değildir. Özellikle,örneğin uygunsuz bakım, hijyen veya lokal doğum kontrol yöntemleri sebebiyle vajinal mukozanın halihazırda hasar görmüş olduğu eğilimli kişilerde jel, izole vakalarda mukozal tahrişe de neden olabilir. Böyle bir durumda Gynofit Laktik Asit Jel'i kullanmayın bırakın ve ayrıca daha sonraki bir tarihte kullanmaya devam etmekten kaçının.

Kontrendikasyonlar

Aşağıda listelenen içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz olduğu biliniyorsa, Gynofit Laktik Asit Jel'i kullanmayın. Bu tür

EN

How Gynofit Lactic Acid Gel works


Gynofit Lactic Acid Gel is used to stabilise the physiological pH of the vaginal environment and thus normalise the vaginal flora.

Intended use

- Gynofit has been developed in cooperation with gynaecologists for fast and gentle relief of vaginal problems.
- For prevention and short-term treatment (generally 6-12 days) of bacterial vaginosis and vaginal yeast infections.
- For treatment of bacterial vaginosis in combination with antibiotics.
- Restores the vaginal flora and regulates the pH value.
- Reduces unpleasant odours and discharge.
- Immediately relieves irritation, redness, burning and itching.

Method of use and dose

Gynofit is a gel that is introduced to the vagina in a lying position in the evening. Each tube contains one application dose. The gel is directly introduced to the vagina from the specially shaped, sealed applicator.



Side effects

Judging from its composition and provided it is used properly according to the manufacturer's recommendation, Gynofit Lactic Acid Gel is not likely to have any side effects apart from initial but reversible burning and/or itching. In predisposed individuals, especially if the vaginal mucosa is already damaged owing to unsuitable care, hygiene or local contraceptives for example, the gel can also cause mucosal irritation in isolated cases. In such a case, discontinue using Gynofit Lactic Acid Gel; also refrain from resuming use at a later date.

Contraindications

Do not use Gynofit Lactic Acid Gel if you are known to be allergic to any of the ingredients listed below. If such reactions are triggered, immediately discontinue using the gel. Consult a doctor if necessary.

Use

Short-term use for bacterial vaginosis and vaginal yeast infections. In the case of bad smelling discharge, irritation, redness, burning and itching in the vaginal area. Treatment: Use for 6 – 12 days, ideally in the evening, with 1 applicator for each application, until there is no longer any discomfort. Prevention: After menstruation, sexual intercourse and visiting a swimming pool, use for 1 – 2 days, with 1 applicator for each application. Gynofit Lactic Acid Vaginal Gel is best applied before going to bed.

Notes

If the symptoms are not alleviated despite proper use, please consult your doctor or pharmacist after 12 days of continued use at the latest. Gynofit cannot be used for contraception and it does not contain any spermicidal ingredients. As regards use during pregnancy and breastfeeding there is no information available. Gynofit Lactic Acid Gel can be used together with condoms. Store out of children's reach. Empty the tubes completely and do not use opened tubes a second time. Do not use damaged applicators. Store at room temperature (15–25 °C). For the use-by date see packaging.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid



Swiss distributor: Tentan AG, 4452 Itingen

UK distributor: Tentan UK Ltd., Four Winds Stansted CM24 8UF, UK

www.gynofit.com
04.2026

☎ € 0483 MD

HR

Kako djeluje Gynofit gel s laktatnom (mliječnom) kiselinom


Gynofit gel s laktatnom (mliječnom) kiselinom primjenjuje se za stabilizaciju fiziološkog pH okruženja rodnice i na taj način normalizaciju flore rodnice.

Namjena

- Gynofit je razvijen u suradnji s ginekolozima za brzo i nježno ublažavanje tegoba rodnice.
- Za sprječavanje i kratkotrajno liječenje (obično 6 – 12 dana) bakterijske vaginoze i infekcije rodnice gljivicama iz roda kvasnica.
- Za liječenje bakterijske vaginoze u kombinaciji s antibioticima.
- Obnavlja floru rodnice i regulira pH vrijednost.
- Smanjuje neugodan miris i iscjedak.
- Odmah ublažava nadraženost, crvenilo, osjećaj pečenja i svrbež.

Način primjene i doziranje

Gynofit je gel koji se stavlja u rodnicu u ležećem položaju, navečer. Jedna tuba je za jednokratnu primjenu. Gel se istiskuje izravno u rodnicu iz posebno oblikovanog, zabrtvljenog aplikatora.



Štetni događaji

Sudeći prema sastavu i pod uvjetom da se pravilno primjenjuje, prema preporuci proizvođača, primjenom Gynofit gela s laktatnom (mliječnom) kiselinom, nije vjerojatna pojava štetnih događaja osim početnog, ali reverzibilnog osjećaja pečenja i/ili svrbeža. Kod osjetljivih žena, posebno ako je suznica rodnice već oštećena, zbog neodgovarajuće njege, izjelenje ili primjene lokalnih kontraceptiva, u izoliranim slučajevima, gel također može uzrokovati nadraženost sluznice. U tom slučaju, prekinite primjenu Gynofit gela s laktatnom (mliječnom) kiselinom; također se suzdržite od kasnijeg nastavka primjene.

Kontraindikacije

Nemojte primjenjivati Gynofit gel s laktatnom (mliječnom) kiselinom ako je poznato da ste alergični na bilo koji sastojak naveden u nastavku. Ako se takve reakcije pokrenu, odmah prestanite primjenjivati gel. Po potrebi, obratite se liječniku.

Χρήση

Βροχολιποθεση χρήση για αντιμετώπιση βακτηριακής κολπιδίας και κολπικών μυκητιάσεων. Για περιπτώσεις δύσοσμων εκκρίσεων, ερεθισμού, ερυθρότητας, αισθήματος καύσου και κνησμού στην κοιλική περιοχή. Θεραπεία: Χρησιμοποιήστε ένα σωληνάριο για διάστημα 6-12 ημερών, ιδανικά το βράδυ, μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως οι ενοχλήσεις.

Πρόληψη: Έπειτα από εμμηνορροία, σεξουαλική επαφή και επίσκεψη σε πισίνα, χρησιμοποιήστε 1 σωληνάριο για 1-2 ημέρες. Η κοιλική γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ εφαρμόζεται κατά προτίμηση πριν από την κατάκλιση.

Σημειώσεις

Αν χρησιμοποιείτε τη γέλη σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοπόιο σας έπειτα από 12 ημέρες συνεχούς χρήσης το αργότερο. Το Gynofit δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αντισύλληψης και δεν περιέχει σπερματοκτόνα συστατικά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Η γέλη Gynofit με γαλακτικό γξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με προφυλακτικά.

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Αδειάζετε το περιεχόμενο των σωληναρίων. Μην επαναχρησιμοποιείτε ανοιγμένα σωληνάρια. Απαγορεύεται η χρήση σωληναρίων που έχουν υποστεί ζημιιά.

Νο φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15–25 °C).

Για την ημερομηνία λήξης, βλ. τη συσκευασία.

Συστατικά:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl-cellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

	Swiss Development
	<u>Tentant AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen</u>
	Tentant Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Διανομέας Ελβετίας: Tentan AG, 4452 Itingen

Διανομέας Ελλάδας: KITE Hellas Ltd., Λεωφόρος Ιωνίας 166, 111 44 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 2014306

www.gynofit.com
04.2026

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

ES

Cómo actúa el gel con ácido láctico Gynofit

El gel con ácido láctico Gynofit estabiliza el pH fisiológico de la vagina y normaliza así la flora vaginal.




Uso previsto

Gynofit ha sido desarrollado en colaboración con especialistas en ginecología con el fin de aliviar los problemas vaginales de forma rápida y suave.

- Para la prevención y el tratamiento de corta duración (generalmente de 6 a 12 días) de la vaginosis bacteriana y las infecciones por hongos vaginales.
- En casos de vaginosis bacteriana, se aplica en combinación con antibióticos.
- Restaura la flora vaginal y regula el pH.
- Reduce los olores desagradables y la leucorrea.
- Alivia de forma inmediata la irritación, el enrojecimiento, el ardor y el picor.

Posología y modo de utilización

Gynofit es un gel que se aplica en la vagina por la noche, en posición acostada. Cada tubo contiene una dosis de aplicación. El gel se administra directamente en la vagina por medio del aplicador ergonómico sellado.

	1. Agite el tubo para que el contenido se desplace hacia la punta
	2. Rompa y retire la punta del tubo haciéndola girar
	3. Introduzca el aplicador en la vagina
	4. Presione el tubo para introducir todo el contenido en la vagina

Efectos secundarios

Dada la composición del gel con ácido láctico Gynofit, si se utiliza el producto correctamente siguiendo las recomendaciones del fabricante, no es probable que se produzcan efectos secundarios, salvo un ardor o un picor iniciales pero reversibles. En las personas predispuestas y, en particular, si la mucosa vaginal está dañada, por ejemplo, por medidas de cuidado o de higiene inadecuadas o por el uso inapropiado de un anticonceptivo local, el gel puede irritar la mucosa en casos aislados. En estos casos, interrumpa el uso del gel con ácido láctico Gynofit y no vuelva a usarlo en el futuro.

Contraindicaciones

No use el gel con ácido láctico Gynofit si tiene una alergia conocida a alguno de los componentes indicados más adelante. Deje de usar inmediatamente el gel si se produce una reacción alérgica. Consulte a su médico en caso necesario.

Uso

Utilización de corta duración en caso de vaginosis bacteriana y de micosis vaginal. Combate el flujo de olor desagradable, la irritación, el enrojecimiento, el ardor y el picor de la zona vaginal.

Tratamiento: utilizar 1 aplicador al día durante 6-12 días, preferentemente por la noche, hasta que desaparezcan las molestias.

Prevención: utilizar 1 aplicador al día durante 1-2 días después de la menstruación, las relaciones sexuales y los baños en la piscina.

Aplicar el gel vaginal con ácido láctico Gynofit preferentemente antes de acostarse.

Observaciones

Si los síntomas persisten a pesar de usar correctamente el gel, consulte a su médico o farmacéutico como muy tarde después de 12 días de uso continuado. Gynofit no contiene agentes espermicidas y, por tanto, no es apto como anticonceptivo.

No se dispone de información en relación con el uso del gel durante el embarazo y la lactancia. El gel con ácido láctico Gynofit puede usarse junto con preservativos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Vacíe completamente los tubos y vuelva a usar un tubo abierto. No utilice aplicadores dañados.

Consérvese a temperatura ambiente (15–25 °C).

Véase la fecha de caducidad en el envase.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl-cellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

	Swiss Development
	<u>Tentant AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen</u>
	Tentant Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Distribuidor suizo:
Tentan AG, 4452 Itingen

www.gynofit.com
04.2026

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

							
---	--	---	---	---	---	---	---

Vartoijamas

Skirtas trumpalaikiam bakterinės vaginozės ir makšties kandidamikozės gydymui. Vartoijamas pasireiškus nemalonų kvapą turinčioms išskyroms, dirginimui, paraudimui, deginimui ir niežėjimui makšties srityje. Naudojimas: 6–12 dienų naudoti po 1 aplikatorių, geriausia vakarais, kol simptomai praeis. Profilaktika: po menstruacijų, lytinio akto ir apsilankymo baseine 1–2 dienas naudoti 1 aplikatorių. „Gynofit“ pieno rūgšties makšties gelį geriausia vartoti prieš miegą.

Pastabos

Jei tinkamai vartojant simptomai nesumažėja, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką ne vėliau kaip po 12 dienų nuolatiniu vartojimo. „Gynofit“ negalima vartoti kontracepcijai, jo sudėtyje nėra spermicidinių pagalbinių medžiagų.

Informacijos apie vartojimą nėštumo ir žindy-mo metu nėra. „Gynofit“ pieno rūgšties gelį galima vartoti kartu su prezervatyvais.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Visiškai ištuštinkite tūbeles ir nenaudokite atidarytų tūbelių antrą kartą. Pažeistų aplikatorių naudoti negalima.

Laikyti kambario temperatūroje (15–25 °C).

Tinkamumo laikas nurodytas ant pakuotės.

Sudėtis:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl-cellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

	Swiss Development
	<u>Tentant AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen</u>
	Tentant Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Platintojas Šveicarijoje:
Tentan AG, Itingen CH-4452

Platintojas Lietuvoje:
UAB „ViaMedPharma“, Vilnius LT-04352

www.gynofit.com
04.2026

							
---	---	---	---	---	---	---	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

PT

Como funciona o Gel Gynofit com Ácido Láctico

O Gel Gynofit com Ácido Láctico é utilizado para estabilizar o pH fisiológico do ambiente vaginal, normalizando, assim, a respetiva flora.





Indicação de utilização

O Gynofit foi desenvolvido em cooperação com ginecologistas para o alívio rápido e suave de problemas vaginais.

- Para prevenção e tratamento e curta duração (geralmente, de 6 a 12 dias), da vaginose bacteriana e das infeções fúngicas vaginais.
- Para o tratamento de vaginose bacteriana em combinação com antibióticos.
- Restabelece a flora vaginal e regula o valor de pH.
- Reduz odores desagradáveis e corrimento.
- Alivia imediatamente irritação, vermelhidão, ardor e prurido.

Modo de utilização e posologia

O Gynofit é um gel que é introduzido na vagina à noite, na posição horizontal. Cada tubo contém uma para aplicação. O gel é introduzido diretamente na vagina através do aplicador selado, com uma configuração especialmente concebida para o efeito.

	1. Agite o conteúdo do tubo em direção à extremidade do mesmo
	2. Quebre a extremidade do tubo, torcendo-a
	3. Introduza o aplicador na vagina
	4. Aperte o tubo introduzindo o conteúdo na vagina

Efeitos secundários

Tendo em conta a sua composição e desde que utilizado corretamente, de acordo com a recomendação do fabricante, não é provável que o Gel Gynofit com Ácido Láctico produza quaisquer efeitos secundários para além de uma sensação inicial de ardor e/ou prurido, que é reversível. Em casos isolados, o gel poderá ocasionar irritação da mucosa em mulheres com alguma predisposição nesse sentido, especialmente se a mucosa vaginal já estiver danificada devido a cuidados ou higiene inadequados, ou à utilização de contracetivos de aplicação tópica. Se for o caso, deverá descontinuar a utilização do Gel Gynofit com Ácido Láctico e não o utilizar futuramente.

Contraindicações

Não utilize o Gel Gynofit com Ácido Láctico se tiver conhecimento de que é alérgico a qualquer um dos ingredientes abaixo indicados. Se essas reações ocorrerem, interrompa imediatamente a utilização do gel. Consulte um médico, se necessário.

Utilização

Utilização de curta duração para a vaginose bacteriana e as infeções fúngicas vaginais. Adequado em caso de corrimento com odor desagradável, irritação, vermelhidão, ardor e prurido na zona vaginal.

Tratamento: Utilizar durante 6 a 12 dias, de preferência à noite, usando 1 aplicador em cada aplicação, até que os sintomas desapareçam.

Prevenção: Após a menstruação, relações sexuais e idas à piscina, utilize durante 1 a 2 dias, usando um aplicador em cada aplicação.

Preferencialmente, o Gel Vaginal Gynofit com Ácido Láctico deve ser aplicado antes de se deitar.

Observações

Se não sentir alívio dos sintomas apesar da utilização correta, consulte o seu médico ou farmacêutico, o mais tardar após 12 dias de utilização contínua. O Gynofit não pode ser utilizado como contracetivo e não contém ingredientes espermicidas.

Não existe informação disponível relativa à utilização durante a gravidez e a amamentação. O Gel Gynofit com Ácido Láctico pode ser utilizado com preservativos.

Manter fora do alcance das crianças.

Esvaziar os tubos completamente e não voltar a utilizar tubos já usados. Aplicadores danificados não devem ser utilizados.

Conservar à temperatura ambiente (15–25 °C). Ver o prazo de validade na embalagem.

Ingredients:

Água, Propilenoglicol, Hidroxipropilmetilcelulose, Ácido Láctico, Lactato de Sódio, Caprilil, Glicol, Ácido Levulínico, Glicogénio, Glicerina, Levulinato de Sódio, Hidróxido de Sódio, Ácido P-Anísico

	Swiss Development
	<u>Tentant AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen</u>
	Tentant Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Distribuidor na Suíça:
Tentan AG, 4452 Itingen

Distribuidor em Portugal:
CS Portugal – Produtos Farmacêuticos, Lda, 2750-511 Cascais

www.gynofit.com
04.2026

							
---	---	---	---	---	---	---	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

reaksiyonlar tetiklendiği takdirde, jeli kullanma- yı derhal bırakın. Gerekirse, bir doktora danışın.

Kullanım

Bakteriyel vajinozis ve vajinal mantar enfeksiyonları için kısa süreli kullanm. Vajinal bölgede kötü kokulu akıntı, tahriş, kızamıklik, yanma ve kaşıntı olmasi halinde önerilir.

Uygulama: Semptomlar kaybolana kadar 6-1